

11月度の観察記録

カテゴリ : 2007年

_MD_POSTEDON投稿者: [Zz.admin](#) 掲載日: 2007-4-8

```
Untitled Page      var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?  
"https://ssl." : "http://www.");  document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost +  
"google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));  var pageTracker  
= _gat._getTracker("UA-3205823-1");  pageTracker._initData();  
pageTracker._trackPageview();
```


朝から雨が降り、自宅から出るときに躊躇した人も多かったと思います。集合時間の少し前から雨はやんでいましたが、その後は降ったりやんだり、観察会途中では、陽も少しだけ差すような天候で、傘を差したりたたんだりしました。秋の気配が濃厚で、街路樹のトウカエデ（唐楓、カエデ科）が、紅葉して大変きれいでした。ただし、個体差があり、並んでいても全体が紅葉しているものとまだ緑を維持しているものが例年のように混在していました。イチョウ（銀杏、イチョウ科）とサクラ（桜、バラ科）の黄葉もきれいでした。





黄葉したイチョウ 紅葉したサクラ 新池には、**アオサギ**（青鷺，サギ科），**ダイサギ**（大鷺，サギ科）および**コサギ**（小鷺，サギ科）がそれぞれ1羽ずつ来ていて，雨で多少水位があがっていましたが，開掘のため水を抜いていたため，池の真ん中で餌を採っていました．ヒヨドリ（鶉，ヒヨドリ科）とハクセキレイ（白鶺鴒，セキレイ科）は水面上を飛んでいました．集合場所の上の電線には，6羽のハクセキレイが風にあおられてとまったり飛んだりしていました．天候が良くなかったため，参加者は子供1名を含む17名でしたが，少人数でなごやかな観察会になりました．





アオサギ ダイサギ コサギ 集合場所で，参加者が持ってきたスダジイ（すだ椎，ブナ科）とマテバシイ（全手葉椎または馬刀葉椎，ブナ科）の煎ったドングリ（団栗）を食べながら，同じく参加者が持ち寄った木の実などを観察しました．ドングリを集めるときは，新鮮なものを選ぶため，尻が白くて落ちたばかりのものを拾うという話がありました．

持ち寄ったものを観察する前に，ある女性参加者の子供の修学旅行の顛末記が出ました．宿で女の子達の部屋に，男の子達が夜にトランプをやりにきて問題となり，7名の親が駅に呼び出されて注意を受けたということでした．生徒だけでなく先生も最近では世間から監視されており，不祥事に対して非常に敏感になっているようです．観察会の参加者は，自分たちも子供の頃はそのようなことをやっていたということもあり，そんなことで親を呼び出してという感じで，子供達の行動に寛容な雰囲気でしたが，何を守るかという議論になりました．教育の現場が昔より大変なことは，私も実感しています．

この話が出た後で，かなりの雨が降ってきて，結局，傘を差さざるをえなくなりました．

まず，ガラスビンに入った新池のマツモ（松藻，**ギンセ科**又と銀蜻蜒，ヤンマ科）の**ヤゴ**（水?）を観察しました．5 cm長くらいの大きな**ヤゴ**で，メダカなどの小魚を餌としてやるそうです．動くものしか食べないということと，オニヤンマ（鬼蜻蜒，ヤンマ科）のヤゴにくらべよく食べるということが説明されました．






ギンヤンマのヤゴ 報告では、アサギマダラ（浅葱斑，タテハチョウ科）とヤブマメ（藪豆，マメ科）が取り上げられました。ある参加者が、先月の観察会の後で、同じ場所に行ってもツルマメ（蔓豆，マメ科）は無かったので、やはり平和公園にはヤブマメしかないのではという報告がありました。ツルマメは、ヤブマメより1ヶ月くらい実のなるのが早いので、もう無かった可能性が高く、先月の観察では、確かに葉や実の特徴も違ったという意見が出ました。来年度、再度、確認することになりそうです。

この後で、**アオツツラフジ**（青葛藤，ツツラフジ科），シロサワフタギ（白沢蓋木，ハイノキ科，別名：クロミノニシゴリ（黒実の錦織木）），エノキ（榎，ニレ科），カマツカ（鎌柄，バラ科），シャリンバイ（車輪梅，バラ科），シャシャンボ（小々坊，ツツジ科），センダン（梅檀，センダン科），タカノツメ（鷹の爪，ウコギ科）などの葉と実の付いた枝を観察しました。特に、**アオツツラフジ**の青い実の中の種は、アンモナイトの形をしているということで、果肉は毒だと言われても、噛んで種を出した人がいました。小さいですが確かにアンモナイトそっくりでした。シロサワフタギは、伊勢湾岸要素であるという説明もありました。また、**アブラギリ**（油桐，トウダイグサ科）と**ザクロ**（石榴，ザクロ科）の実も観察しました。アブラギリの実は、戦時中に軍事用の油（有毒，塗料や油紙の原料）にするために集めさせられたという体験談も出ました。





アオツツラフジの種 アブラギリの実 ザクロの実やドングリなど 平和公園に行く前に、傘を差しながら、新池の柵の中へ運動場から入りました。新池の南側の土手に置かれて、鳥よけの網をかぶせた2つの水槽の小魚などを網ですくって観察しました。外来種は駆除したそうです。水の循環は、洗濯機にお風呂の水を入れるポンプを使っていました。ギンブナ（銀鮒、コイ科）、トウヨシノボリ（橙葦登、ハゼ科）、モツゴ（持子、コイ科）、サナエトンボ（早苗蜻蛉）科のヤゴおよびスジエビ（条蝦または筋蝦、テナガエビ科）などがいました。チョウトンボ（蝶蜻蛉、トンボ科）のヤゴではという人もいましたが、アカネ系のトンボは卵で冬を越すので、サナエトンボ科だということになりました。スジエビは、種々の生物の死体を掃除してくれるという話もでしたが、生きた魚も食べるようです。


[【外部リンク】スジエビ残酷物語](#)



トウヨシノボリとギンブナ 水槽の横に、ヘドロの中から採ったスイレン（睡蓮，スイレン科）の根が網をかぶせて積まれていました．今回の業者への入札仕様では，水面清掃とヘドロの一部除去ということで，結局，スイレンの根を業者が除去できないということになり，ボランティアにより一部だけを区切って，試しに採ったのが積まれていたものでした．それも，ヘドロが付いていると処理業者が引き取らないので，きれいに洗ってありました．どちらにしても，大半のスイレンの根はヘドロの中に残っているため，来年も水面はスイレンで埋まる可能性が高いようです．

このとき，薄日が差してきて傘をたたみました．新池の歴史的な変遷について説明があり，昭和初期まで星ヶ丘の三越あたりまで広がっていた池（七ツ釜池）を埋め立て整備し1984年から3年間で護岸工事と浚渫をして今の形になったそうです．上池，新池そして猫が洞池は暗渠でつながられて，順番にオーバーフローする水がたまり，それでもオーバーフローする水は猫が洞池のベルマウスから流出させているそうです．この話の時に，カワセミ（翡翠，カワセミ科）が新池に飛び込んで小魚を捕りました．気づいた数名の参加者だけが目撃しました．セグロセキレイ（背黒鶺鴒，セキレイ科）も水辺にいましたが，これはじっくりと観察できました．

新池の安定系はという話の中でレンは外来種であり除去した方がよいということになりました．スイレンの根の断面を割って観察しました．レンコン（蓮根，スイレン科）とは違って，中は中空ではなく白い果肉が詰まっていた．新池の観察を終わって，鉄柵を越えて外へ出るときに，鉄柵が高いので，お歳の方はかなり苦労して，他の参加者に助けってもらっていました．



スイレンの根 スイレンの根の断面 里山の家に寄り，新池で捕った大きなライギョ（雷魚，タイワンドジョウ科）を観察した後，平和公園にいつもの農道を通って入りました．アベマキ（阿部槇または？，ブナ科）の根元の樹液の出ているところに，オオスズメバチ（大雀蜂，スズメバチ科）が2匹いました．近寄らないようにトラ柵が周辺にしてありました．スズメバチに刺されたことがある参加者の体験談が出ました．ハチが近づいてきても，手ではらわず姿勢を低くするのがよいそうです．刺されても騒がず冷やして急いで病院に行くことを勧められました．1回目に刺された時でも病院に行って抗体検査を受けてアナフィラキシーの可能性を確認するとよいそうです．10%くらいの人が，抗体ができてしまうそうです．スズメバチに刺されて，1984年が最高で全国で73名が死亡し，最近では毎年30名程度が死亡するそうです．


[【外部リンク】都市のスズメバチ](#)

[【外部リンク】スズメ蜂にさされた時](#)

モズ（百舌鳥，モズ科）の高鳴きが近くで**あうま**た唐竹，イネ科）を少し除去したところで，**ナンテン**（南天，メギ科）の赤い実を見ました．芝生広場横の陽当たりの良い場所に，はざかけ用に竹が組まれていました．



トウチク ナンテン 芝生広場から東へ、舗装された斜面を登って行きました。途中で、ススキ（薄，イネ科）に似た**ウンヌケ**（和名：牛の毛，イネ科）を観察しました。第?種絶滅危惧種に指定されているそうです。ウンヌケモドキ（イネ科）との違いは、茎の根元に毛があることだそうです。ススキと違って、葉の表面が粗くて、裏面に光沢がありました。また、集合の時に見た**アオツツラフジ**もあり、濃青色の実を沢山つけていました。蔓は左巻きでした。近くで、男の子が**ソヨゴ**（冬青，モチノキ科）の赤い実に小さな黒い穴があいているのを見つけました。穴が数個あいているものもあり、よく観察すると穴は種まで達していました。卵を産み付けた穴か、虫が出てきた穴かという疑問がでました。





ウンヌケの光沢のない葉の表面 ウンヌケの光沢のある葉の裏面 アオツツラフジ 穴のあいたソヨゴの実 **ヌルデ**（白膠木，ウルシ科）が見事に紅葉していました。独特の実を付けているものもありました。舗装されている小径の上でケバエ（毛蠅，ケバエ科）の幼虫のコロニーを2つ見つけました。大きい方は約300匹がうごめいていました。多分，舗装の上の犬のフンに産卵されて，生まれた幼虫だろうということになりました。

感想会は，パンパスグラス（和名：シロガネヨシ，イネ科）の前の椅子が整備された場所で行いました。ウグイス（鶯，ウグイス科）のチャチャという地鳴きが周辺で聞こえました。後ろの方にはアオギリ（梧桐または青桐，アオギリ科）が黄葉して落ちかけていました。ここで，また雨が降ってきて傘を差さざるをえなくなりました。鳥の巣箱をかけるのは，環境によいのかという話に対して，ずっと面倒をみるつもりならよいが，普通は環境にはよくないという話がありました。巣箱は木の穴などを巣として利用する特定の野鳥しか使わないので，鳥類相のバランスを崩すなど多くの問題があるようで，周辺環境をよく理解し，かなり限定した使い方が必要とされています。愛鳥週間などに，安易に巣箱をかけることは，最近少なくなりましたが，環境の破壊につながるという認識も必要なようです。

[【外部リンク】巣箱を作ろう（財団法人日本鳥類保護連盟）](#)

天候には恵まれませんでした，歩くのには支障はなく，少人数でよく観察できたという感想も出ました。実りの秋と冬支度を始めた生き物たちに接した楽しい観察会になりました。





感想会 観察項目：アオサギ，ダイサギ，コサギ，ハクセキレイ，セグロセキレイ，シジュウカラ，ヒヨドリ，スダジイのドングリ，マテバシイのドングリ，実の付いた枝（アオツツラフジ，オオバヤシャブシ，シロサワフタギ（クロミノニシボリ），クスノキ，ソヨゴ，シャシャンボ，シャリンバイ，ピナンカズラ，センダン，エノキ，タカノツメ），コブシの実，ザクロの実，アブラギリの実，ギンヤンマのヤゴ，サナエトンボ科のヤゴ，マツモ，スイレンの根，ギンブナ，トウヨシノボリ，スジエビ，カワセミ，ウシガエル，ライギョ，ナンテン，トウチク，オオスズメバチ，ウンヌケ，穴のあいたソヨゴの実，コバノガマズミ，アオツツラフジ，ヌルデ，ウグイス地鳴き，アオギリ（概ね観察順）

文・写真：伊藤義人 監修：滝川正子